

PREPARAZIONE ALL'ESAME DELL'INTESTINO CON MOUIPREP®

Per l'esame endoscopico del colon (colonscopia/endoscopia intestinale), l'intestino deve essere assolutamente pulito. Solo così il medico ha una visibilità ottimale durante l'esame e può riconoscere eventuali alterazioni dei tessuti intestinali. Lei ha ricevuto dallo specialista MOUIPREP® o MOUIPREP® ORANGE per la preparazione all'esame dell'intestino. MOUIPREP® è un prodotto in polvere contenente POLETILENGLICOLE (PEG), un lassativo che stimola l'intestino. MOUIPREP® contiene anche acido ascorbico e sodio solfato, un altro lassativo, che provoca il completo svuotamento e la perfetta pulizia intestinale, tramite la ritenzione di liquidi all'interno dell'intestino.

SEGUA, QUINDI, ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI!

Come usare MOUIPREP®?

MOUIPREP® va preso seguendo sempre scrupolosamente le istruzioni del medico. In caso di incertezze, si rivolga al Suo medico.

PREPARAZIONE

1. Una confezione di MOUIPREP® contiene 2 bustine A e 2 bustine B
2. Versare in un recipiente da 1 litro il contenuto di 1 bustina A e 1 bustina B. Aggiungere acqua al recipiente fino ad ottenere 1 litro di soluzione di MOUIPREP®.
3. Mescolare per 2-3 minuti fino a che il liquido sia quasi limpido. Fare raffreddare la soluzione in frigorifero. Bere, quindi, la soluzione di MOUIPREP® fredda (un bicchiere da 250 ml ogni 10-15 minuti).
4. Preparare il 2° litro di MOUIPREP® nello stesso modo e berla fredda (un bicchiere da 250 ml ogni 10-15 minuti).

ATTENZIONE! Dopo l'assunzione del 1° litro di MOUIPREP® (un bicchiere da 250 ml ogni 10-15 minuti), bere almeno 4 volte 250 ml di un liquido limpido, distribuiti in diverse ore. Liquidi limpidi sono, ad esempio, i succhi di frutta limpidi (senza polpa), le bevande rinfrescanti, i brodi limpidi, il tè, il caffè (senza latte) e l'acqua. La stessa cosa dopo l'assunzione del secondo litro di MOUIPREP®. Non bere solo acqua!

PROGRAMMA DI ASSUNZIONE DI MOUIPREP®

Data dell'esame endoscopico o radiologico

Indirizzo/Timbro

Data

Ora

PREPARAZIONE

1° assunzione di MOUIPREP®

Data

Ora

2° assunzione di MOUIPREP®

Data

Ora

ATTENZIONE! Dopo l'assunzione del 1° litro di MOUIPREP® (un bicchiere da 250 ml ogni 10-15 minuti), bere almeno 4 volte 250 ml di un liquido limpido, distribuiti in diverse ore. Liquidi limpidi sono, ad esempio, i succhi di frutta limpidi (senza polpa), le bevande rinfrescanti, i brodi limpidi, il tè, il caffè (senza latte) e l'acqua. La stessa cosa dopo l'assunzione del secondo litro di MOUIPREP®. Non bere solo acqua!

- 250 ml alle
- 250 ml alle
- 250 ml alle
- 250 ml alle
- 250 ml alle
- 250 ml alle
- 250 ml alle
- 250 ml alle
- 250 ml alle
- 250 ml alle

- 250 ml alle
- 250 ml alle
- 250 ml alle
- 250 ml alle
- 250 ml alle
- 250 ml alle
- 250 ml alle
- 250 ml alle
- 250 ml alle
- 250 ml alle

Barrare i quadratini dopo l'assunzione di liquidi e annotare l'ora. Successivamente, le feci devono essere limpide e senza sostanze solide.